

PCDAI (Hyams at al. JPGN,1991,12:439-447)

Hasfájás

| | |
|----------------------------|---------|
| - | 0 pont |
| Enyhe aktivitást nem zavar | 5 pont |
| Súlyosabb aktivitást zavar | 10 pont |

Székletszám naponta

| | |
|--|---------|
| 0-1 | 0 pont |
| 1-2 kissé véres vagy 2-5x híg | 5 pont |
| Nagyobb vér vagy 6-nál több híg vagy éjjeli hasmenés | 10 pont |

Általános állapot

| | |
|---|---------|
| Jól van,aktív | 0 pont |
| Időnként rosszul van, aktivitása csökken | 5 pont |
| Gyengén van, kifejezett aktivitás csökkenés | 10 pont |

Ht

| | |
|-----------|---------|
| 34 felett | 0 pont |
| 30-33 | 5 pont |
| 29 alatt | 10 pont |

We

| | |
|-----------|---------|
| 20 alatt | 0 pont |
| 20-50 | 5 pont |
| 50 felett | 10 pont |

Albumin

| | |
|-----------|---------|
| 35 felett | 0 pont |
| 31-34 | 5 pont |
| 30 alatt | 10 pont |

Súlygyarapodás

| | |
|----------------------------------|---------|
| Megfelelő | 0 pont |
| Súlyállás, 1-9%-os súlycsökkenés | 5 pont |
| 10% vagy nagyobb súlycsökkenés | 10 pont |

Hossznövekedés elmaradása

| | |
|-----------------|---------|
| 1 SD-nél kisebb | 0 pont |
| 1-2 SD | 5 pont |
| 2SD-nél több | 10 pont |

Has tapintás

| | |
|--|---------|
| Nem érzékeny, nincs terime | 0 pont |
| Érzékeny, terime hasfájás nélkül | 5 pont |
| Érzékenység, tapintható terime hasfájással | 10 pont |

Perirectalis elváltozás

| | |
|-----------------------------|---------|
| - | 0 pont |
| 1-2 alig váladékozó fistula | 5 pont |
| Aktív fisztula, tályog | 10 pont |

Extraintestinalis manifesztáció

T:38,5 felett 3 napja, arthritis, uveitis, EN, Pyoderma gangrenosum

| | |
|-------------|---------|
| - | 0 pont |
| 1 | 5 pont |
| 2 vagy több | 10 pont |

ÉRTÉKELÉS:

0-100

| | |
|----------------------------------|----------|
| Teljes remisszi, nincs aktivitás | 10 alatt |
| Mérsékelt aktivitás | 11-30 |
| Súlyos , kifejezett aktivitás | 31-100 |