



Az eosinophil oesophagitis gyermekkori jellegzetességei

Dr. Szentannay Judit, Dr. Karoliny Anna, Dr. Szabó András,
Dr. Gombos Eszter, Dr. Vass Viktória, Dr. Müller Katalin Eszter

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2024. 10.03-05



Eosinophil oesophagitis

- A nyelőcső krónikus gyulladásos betegsége, melyet a nyelőcső diszfunkció tünetei, szövettanilag pedig döntően eosinophil gyulladása jellemez.
- Prevalencia: 50/100000
- Lifetime risk férfiak: 0,33% (1:295) nők: 0,12% (1: 813)




Eosinophil oesophagitis retrospektív elemzés (2014-2024)

- 71 beteg
- 81,6 % férfi (pEEr: 61% férfi)
- A tünetek megjelenésekor az átlagéletkor: 9,98 év (pEEr: 9,2 év)
- A dg. felállításakor az átlagéletkor: 10,5 év (pEEr: 10,5 év)
- A diagnosztikus késedelem: 0,52 év (pEEr: 1,2 év)




Eosinophil oesophagitis retrospektív elemzés (2014-2024)






Tünetek gyakorisága






Endoszkópos eltérések





W.M.L. 15 éves fiú esete (2023. 12.14.)




- 15 éves, fiú
- FOG, dysphagia
- OGD, szövettan: eo.50/HFP
- PPI iv., majd p.os, aminosav alapú tápszer
- 2024.02.12. OGD- PPI+ topikális szteroid
- 2024.04.29. OGD- PPI+tejmentes



Kezelés

- **Elsődleges kezelés: 69% PPI**
 - tüneti remisszió: 62,7%
 - endoszkópos és szövettani remisszió: 6,7% (pEER: 26%)

Másodvonalbeli kezelés





Terveink

- Magyar eosinophil oesophagitis irányelv
 - Tranzíció
 - Tüneti és endoszkópos score
 - Idegentest ügyeletek, fül-orr-gégészetek
 - Szövettani leletek egységesítése
-

